¿QUÉ ES EL CÁNCER CERVICOUTERINO?

El cáncer es una enfermedad en la cual las células en el cuerpo se multiplican sin control. Cuando este comienza en el cuello del útero, se llama cáncer cervicouterino, o cáncer de cérvix, o cáncer del cuello del útero, siendo los serotipos 16 Y 18 del virus del papiloma humano (VPH) los responsables del desarrollo del cáncer. El cáncer se puede extender a otras partes del cuerpo posteriormente.

Tomada de: larepublica.net

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL CÁNCER CERVICOUTERINO?



- Ninguno (al inicio).
- Fatiga, dolor del abdomen, pérdida de peso y sudores.
- Secreción vaginal, algunas veces maloliente.
- Sangrado irregular, fuera del periodo menstrual, en mujeres en edad reproductiva.
- Puntos de sangre o sangrado post-coito en mujeres de cualquier edad, incluso en mujeres jóvenes.
- Puntos de sangre o sangrado post–menopausia.

¿QUÉ ES EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO?

La infección por el virus del papiloma humano (VPH) es la causa principal de cáncer de cuello uterino en las mujeres. También es un factor de riesgo para el cáncer de pene en los hombres y anal en hombres y mujeres. Los mismos tipos de VPH que infectan las áreas genitales pueden infectar la boca y la garganta.

El VPH generalmente se transmite de una persona a otra mediante el contacto piel a piel durante cualquier tipo de relación sexual.

¿QUIÉNES PUEDEN CONTRAER EL VPH Y ESTÁN EN RIESGO DE CÁNCER CERVICOUTERINO?

Todas las personas que han tenido relaciones sexuales sean vaginales, anales, orales, u otro piel a piel, corren el riesgo de contraer el VPH alguna vez en la vida. Una infección por VPH puede desaparecer por sí misma, sin síntomas y sin desarrollarse en cáncer.

El VPH puede causar cambios en las células del cuello uterino que van desde lesiones de bajo riesgo, lesiones pre-cancerosas, hasta cáncer.

Las verrugas genitales ocasionadas por el virus VPH pueden desaparecer por si mismas o pueden requerir tratamiento, pero no suelen causar cáncer.

Las lesiones precancerosas son una etapa precursora del cáncer cervicouterino. Estas lesiones pueden transformarse en cáncer a lo largo de muchos años si no se detectan y tratan tempranamente.

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR EL CÁNCER CERVICOUTERINO?

1. Obtener información sobre la sexualidad y la infección por VPH.
2. Promover la vacuna contra el VPH.
3. Promover el uso de condones entre quienes están sexualmente activos.
4. Advertir sobre los riesgos del uso del tabaco.



Tomada de: cinconoticias.com

PREVENCIÓN AL ALCANCE DE TU MANO

PAPANICOLAU, PAP O CITOLOGÍA

El examen ginecológico con la prueba de PAP o citología sirve para detectar los cambios en las células del cuello ocasionadas por el VPH para saber si estos son normales o anormales. La muestra la toma un proveedor de salud usando una espátula, o un cepillo durante un examen ginecológico. Las muestras se envían a un laboratorio para ser procesadas y los resultados no son inmediatos.

La citología cervicouterina se debe realizar una vez al año, es tu deber solicitarla oportunamente y reclamar el resultado, ya que cualquier anormalidad encontrada puede tratarse a tiempo de manera efectiva.



¡Es hora, VACÚNATE y tómate la CITOLOGÍA!

Universidad de Boyacá

PREVENGAMOS EL CÁNCER CERVICOUTERINO

División de Bienestar Universitario

PREVENGAMOS EL CÁNCER CERVICOUTERINO



División de Bienestar Universitario

Universidad de Boyacá